



您是否有需要進行愛滋病毒檢驗？

自我風險評估表

以下有六個題目評估感染愛滋病毒的風險，請作答：

是 否

1. 你是否有注射毒品藥物且與他人共用器具(如針頭、針筒或稀釋液)之行為。
2. 是否曾與可能感染愛滋病毒者發生性交且未採保護措施？(如性伴侶為毒癮者、感染性病者、多重性伴侶者或與陌生人發生性行為者、性伴侶曾為購買毒品或金錢與人發生性行為等)。
3. 曾與一個人以上發生未採保護措施的性交或肛交行為。
4. 曾被診斷患有性病或肺結核。
5. 曾經有不明原因發燒或生病。
6. 曾經醫師告知生病原因是因為免疫系統較弱。

註：若有一個以上的答案是很肯定的，則有感染愛滋病毒的風險。



衛生福利部疾病管制署
諮詢專線：1922



高雄市政府衛生局
諮詢專線：0912195258

高雄市愛滋病毒篩檢資訊提供 免費 匿名/具名篩檢單位


單位	地址	電話
高雄市政府衛生局	高雄市苓雅區凱旋二路132-1號	0912195258
高雄市各區衛生所	請上高雄市政府衛生局全球資訊網或洽0912195258查詢	
高雄榮民總醫院	高雄市左營區大中一路386號	(07)3422121 轉8299
義大醫療財團法人義大醫院	高雄市燕巢區義大路1號	(07)6150011 轉5565
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	高雄市三民區自由一路100號	(07)3121101 轉5683
衛生福利部旗山醫院	高雄市旗山區中學路60號2樓	(07)6613811 轉1211或0921-227308

高雄市愛滋病指定醫院 請掛 感染科 門診

單位	地址	電話
高雄榮民總醫院	高雄市左營區大中一路386號	(07)3422121 轉8299
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	高雄市三民區自由一路100號	(07)3121101 轉5683
義大醫療財團法人義大醫院	高雄市燕巢區義大路1號	(07)6150011 轉5565
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	高雄市烏松區大塊路123號	(07)7317123
高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院)	高雄市前金區中華三路68號	(07)2911101

你認識

愛滋病嗎？



衛生福利部疾病管制署



高雄市政府衛生局

關心您



愛滋病又稱「後天免疫缺乏症候群」，愛滋病毒會侵犯人體的免疫系統，使人失去抵抗病菌能力，最後導致死亡。愛滋病目前尚無法治癒，亦無疫苗可預防。

空窗期：指「感染愛滋病毒後，到可以被檢查出來的時間」，愛滋病感染後早期，因抗體尚未產生而使檢驗呈陰性反應，稱為空窗期。在愛滋病毒感染後，大約要6-12週後才能被檢查出來。

愛之叮嚀

千萬不要透過捐血方式檢測愛滋病毒

潛伏期：指「感染愛滋病毒後，到發病的時間」，一般5-10年或更久，如果使用藥物控制治療，可以延緩發病，延長潛伏期。

愛滋病毒之傳染途徑

一、性行為傳染

與感染者發生肛門、陰道、口腔等方式之性交。

二、血液傳染

與吸病毒感染者共用針具及稀釋溶液或使用感染的血液或器官移植。

三、母子垂直傳染

已感染的婦女在妊娠期、生產期或授餵母乳時可能將病毒傳染給嬰兒(在沒有任何治療的情況下，感染的機會由15%-40%不等)。



親吻、蚊蟲叮咬、日常生活社交，例如：擁抱、握手、共餐、共用馬桶、游泳、衣服一起洗、一起工作及居住等皆不會感染。



- 1、要拒絕性誘惑、忠實與固定的單一性伴侶，發生性行為時要全程正確使用保險套。
- 2、不要與人發生共用針頭、針筒或稀釋液等可能傳輸血液的行為。
- 3、感染愛滋病毒的懷孕婦女應該要接受醫師治療，經由投與藥物等措施預防胎兒感染。



正確保險套及潤滑液的選擇

- 1、有衛生署醫療器材認可字號
- 2、包裝上清楚註明使用年限
- 3、包裝不具透光性且完整無破損
- 4、選擇**水性**潤滑液避免保險套破損



- 1、性行為務必全程正確使用保險套
- 2、肛交、口交及陰道交時皆需要戴上保險套
- 3、保險套不可重複使用
- 4、使用保險套，只需戴一層，勿戴雙層避免破損



- 1、第一級至第四級藥物(如海洛因、安非他命、搖頭丸、K他命...)等，皆是違禁品，不管販賣、吸食、持有都是違法，因此要接受勒戒或刑罰。
- 2、長期使用違禁藥物，容易傷害腦神經、影響血清素的分泌，甚至在開刀麻醉過程中，無法進行有效的麻醉。
- 3、性行為之前若使用違禁藥物、飲酒或是合併多重性用藥，較容易因藥物的抑制疼痛效果，導致性行為劇烈而弄破保險套，或因暫時性喪失自我意志而不帶套，更容易增加感染愛滋病的風險。





愛滋病的三大傳染途徑



一、性行為傳染

與感染者發生肛門、陰道、口腔等方式之性交。



二、血漿傳染

與感染者共用針具及稀釋溶液或使用感染的血液或器官移植。



三、母子垂直傳染

已感染的母親在妊娠期、生產期或授餵母乳時傳染給嬰兒。

● 愛滋病 不會 傳染的途徑

親吻、蚊蟲叮咬、日常生活社交、擁抱握手、共餐、共用馬桶、衣服一起洗、一起工作及居住等皆不會感染。

● 愛滋病 預防 傳染的途徑

力行三部曲
性福罩著您

A 首部曲 Abstain
拒絕性誘惑

B 二部曲 Be Faithful
忠實性伴侶

C 三部曲 Use a Condom
戴上保險套



毒品使用者 保護秘笈

如何避免愛滋病



第一招 不用毒，馬上戒毒！

任何一種毒品都有潛藏致命性，若不幸已染上毒癮，應儘速尋求專業人員協助戒癮。



第二招 不使用「注射類」毒品

如您已經染上毒癮，還不能完全放棄使用毒品，請勿以「注射」方式使用毒品，很容易感染愛滋病毒、梅毒、B型與C型肝炎等傳染性疾病，或因此導致敗血症而死亡。



第三招 不共用針具和稀釋液

絕對不要重複使用與別人共用針具、針筒、稀釋液。



第四招 一定要戴保險套

若與他人有性行為或性接觸時，請記得每次一定要戴保險套。

愛之叮嚀

正確保險套及潤滑液的選擇：

1. 檢查是否有無衛生署醫療器材認可字號
2. 包裝上是否清楚註明使用年限
3. 注意包裝無破損及不具透光性
4. 選擇水性潤滑液避免摩擦保險套而破裂



關於用藥與性行為的提醒與警告

1. 第一級至第四級藥物皆是違禁品，不管販賣、吸食、持有都是違法，因此要接受勸戒或刑罰。

2. 長期使用違禁藥物，容易傷害腦神經、影響血清素的分泌，甚至在開刀麻醉過程中，無法進行有效的麻醉。

3. 性行為之前若使用違禁藥物、飲酒或是合併多重性用藥，較容易因藥物的抑效疼痛效果，導致性行為劇烈而弄破保險套，或因暫時性喪失自我意志而不帶套，更容易增加感染愛滋病的風險。



高雄市愛滋病篩檢資訊

愛滋病免費匿名/具名篩檢：

高雄市政府衛生局、各區衛生所、高雄榮民總醫院、義大醫療財團法人義大醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、衛生福利部旗山醫院皆有提供。



減害計畫

清潔針具交換

目前本市各區衛生所及指定的藥局有提供清潔針具交換及回收服務，針具自動服務機台設置於衛生所、藥局、醫療院所及公園等，提供民眾便民服務。

愛滋衛教諮詢站



(清潔針具交換點標識)




(針具自動服務機)

替代治療

不想再被毒品控制者，可選擇參加「替代治療」。
「替代治療」是藥癮治療的一種，目前政府有提供部份經費補助。經醫師評估後使用「美沙冬」口服液或是「丁基原啡因」舌下錠等藥物，來減緩注射毒品對身心的傷害，降低因共用針具注射毒品而傳染愛滋病的機率。

(清潔針具執行點及替代治療執行點請上
高雄市政府衛生局全球資訊網或電洽
0912195258查詢、或至本市各區衛生所
索取「高雄市清潔針具衛教諮詢名冊」)



高雄市提供替代治療服務醫院

疾管署指定辦理藥癮戒治醫療機構提供門診、住院，採藥物及心理輔導方式，能有效戒除毒癮。

榮民總醫院	(07)3422121#2145
市立凱旋醫院	(07)7513171#2159
國軍高雄總醫院	(07)7496779
國軍高雄總醫院左營分院	(07)5817121#3419
高雄醫學中和紀念醫院	(07)3121101#6791
阮綜合醫院	(07)3351121#2204
長庚紀念醫院	(07)7317123#6332
慈惠醫院	(07)7030315#3174
義大醫院	(07)6150011#257321
旗山醫院	(07)6613811#1119
維新診所	(07)6231829

相關單位

愛滋病諮詢

高雄市政府衛生局疾病管制處
服務電話：0912195258

毒品諮詢


高雄市毒品危害防治中心
檢舉藥頭專線：0800-024-099按2
24小時戒成專線：0800-770-885

衛生福利部疾病管制署

高雄市政府衛生局 關心您 廣告

愛滋病與毒品之關聯

認識愛滋病



什麼是愛滋病？

愛滋病是後天免疫缺乏症候群的俗稱。愛滋病毒會侵犯人體的免疫系統，使人失去抵抗病菌能力，最後導致死亡。愛滋病目前尚無法治癒，亦無疫苗可預防。

空窗期：指「感染愛滋病毒後，到可以被檢查出來的時間」，愛滋感染後之早期，因抗體尚未產生而使檢驗呈陰性反應，稱為空窗期。在愛滋病毒感染後，大約要6-12週後才能被檢查出來。



愛之叮嚀

千萬 不要 透過捐血方式檢測愛滋病毒

潛伏期：指「感染愛滋病毒後，到發病的時間」，一般5-10年或更久，如果使用藥物控制治療，可以延緩發病，延長潛伏期。